Descriptions d'espèces nouvelles de Phanérogames de la Guyane française,

par M. Raymond Benoist.

Moracées.

Coussapoa Leprieurii R. Ben., nov. sp.

Arbor, ramis crassis, in juventute pallide fulvo-pilosis, deinde glabris. Folia obovata, ad apicem obtusa, ad basim paulum attenuata et rotundata, margine subtus reflexo; pagina superiore satis aspera, inferiore breviter pubescente; costa nervos secundarios 5–7 utrinque gerente, nervulis subtus prominentibus, reticulatis. Capituli florum masculorum parvi, paniculato-cymosi, paniculis pubescentibus, pedunculatis, axillaribus, geminis. Bracteolæ longe pedicellatæ ad apicem triangulariter spatulatæ, pilosæ. Perianthium trilobatum, lobis brevidus rotundatis, externe ad apicem pubescentibus. Stamen unicum, filamento ad basim compresso, alato; antheris bilocularibus. Flores feminei ignoti.

Pétiole long de 7 à 22 millimètres, limbe long de 7 à 12 centimètres, large de 3,5 à 6,5 centimètres; capitules ayant 3 millimètres de diamètre. Guyane française : sans localité [Leprieur].

Cette espèce est voisine du *C. asperifolia* Tréc.; elle s'en distingue par les nervures basilaires de la feuille au nombre de 3, tandis que chez le *C. asperifolia* elles sont au nombre de 5. La face supérieure du limbe est moins rugueuse chez le *C. asperifolia;* le périanthe est plus long, ses lobes proportionnellement beaucoup plus larges; le filet de l'étamine est aplati et ailé à sa base.

Pourouma minor R. Ben., nov. sp.

Arbor ramis griseis, junioribus obscure trigonis. Folia petiolata; petioli longitudinaliter striati facie superiore applanata; limbus oblongus a tertia parte superiore ad basim sensim angustatus; ad apicem breviter et repente acuminatus, margine subrepando; pagina superiore præter costam glabra, inferiore inter nervos adpresse pubescentes tenuissime albescenti-puberula. Stipulæ lanceolato-lineares, acutæ, pagina superiore glabra, inferiore pubes-

centia adpressa, sericea, grisea vestita. Flores ignoti. Pedunculi fructiferi axillares, gemini, ramosi. Fructus ovoidei in perianthio accrescenti ad apicem apiculato adpresse pilosulo inclusi.

Pétiole long de 2 à 5 centimètres; limbe de la feuille long de 11 à 20 centimètres, large de 4 à 8 centimètres; fruit long de 22 millimètres.

Guyane française : Saint-Jean-du-Maroni; petit arbre de 15 mètres [R. Benoist, nos 960 et 978]; environs de Godebert [Wachenheim, 3e série n° 18].

Cette espèce est bien distincte de toutes les autres par la forme de ses feuilles et par ses fruits apiculés.

Ficus anguina R. Ben., nov. sp.

Arbor epiphytica, in trunco aliorum arborum nascens. Radices adventivæ truncum hospitis arcte circumplicantes. Rami glabri, nigricantes. Stipulæ triângulari-lanceolatæ, ad apicem acutæ, pruinosæ. Folia petiolata, glabra, ovata, ad basim cordata, ad apicem obtusa vel apiculata, margine tenuiter undulato; pagina inferiore glaucescente, ad basim tri-vel quinque-nervia, et utrinque 6–8 nervis secundariis instructa. Receptacula gemina axillaria, juniora in involucro communi calyptriformi inclusa, singulum ad basim involucro bilobo instructum; adulta cerasi magnitudinem æquantia, globoso-piriformia, mollia, insipida, brevissime vix conspicue pubescenti-velutina, apice 3 bracteis imbricatis clauso. Achænia matura perigonio trifido instructa, stylo laterali; stigma peltatum, lanceolatum.

Hauteur totale : 35 mètres; feuilles longues de 12–25 centimètres, larges de 8 à 16 centimètres; diamètre du fruit : 22 millimètres.

Guyane française : Acarouany [Sagot, n° 1154]; Charvein [Benoist, n° 343].

Myristicacées.

Myristica Melinonii R. Ben., nov. sp.

Arbor satis procera. Folia oblonga vel lanceolata, ad basim acuta, ad apicem obtusa vel breviter et obtuse acuminata, superne glabra; costa ad basim canaliculata; subtus pilis minutis stellatis sparse vestita, nervis secundariis prominentibus, versus marginem evanidis. Flores dioici, in paniculas axillares, fulvo-pubescentes dispositi. Bracteæ oblongæ, obtusæ, caducæ. Florum masculorum perianthium externe pubescens, usque ad basim trifidum. Stamina tria, filamentis concrescentibus; antheræ oblongæ, columnæ staminalis parte inferiore breviores. Flores feminei et fructus ignoti.

Arbre de 25 mètres de hauteur totale, avec un fût de 15 mètres, muni à sa base d'arcabas hauts de 80 centimètres et larges de 1 mètre. Feuilles

longues de 8–18 centimètres, larges de 2–4,5 centimètres. L'écorce laisse écouler par incision un suc rouge.

Guyane française : Cayenne [Martin]; Maroni, nom vernaculaire : Guinguamadou de montagne [Mélinon]; Acarouany [Sagot]; Charvein [Benoist, n° 666]; Saint-Jean-du-Maroni [Benoist, n^{os} 1010 et 1125]; Godebert [Wachenheim, n^{os} 169 et 262].

Cette plante est voisine du *M. surinamensis* Roland, mais elle en diffère par son périanthe profondément trifide; les feuilles sont atténuées et aigües à la base, moins allongées que celles du *M. surinamensis*.